



Anchusa strigosa Labill.

الاسم العلمي: Anchusa strigosa Labill.

الفصيلة: BORAGINACEAE

الاسم المحلي: كطاء شوكية

التوصيف:

نبات عشبي معمر، مغطى بأوبار كثيفة ذات قواعد درنية، طوله 30-80 سم. الأوراق بسيطة متبادلة، طولها 10-20 سم الأوراق السفلى رهيبة إلى بيضاوية مقلوبة تستدق إلى عنق طويل الأوراق العلوية لاطنة، متطاولة رهيبة، حوافها تامة، الأوراق السفلى معنقة، والعلوية لاطنة. النورات محدودة عقربية، طرفية وجانبية، متفرعة، القنابات رهيبة. الأزهار خماسية الأجزاء منتظمة، السبلات رهيبة، طولها 6-8 مم، ملتحة من الأسفل، عليها صف من الأوبار القاسية على العرق الأوسط. البتلات ملتحة، زرقاء داكنة، أنبوب التويج أطول من الكأس، حراشف التاج قائمة، تحول أوباراً. البتلة 5، مخمصة، ملتحة من أنبوب التويج. الثمار بندقات، قائمة طولها 7، 8 مم، بيضاوية كسبب كيو فال النوع للوفا Labill. أصبح تحت نوع من نفس النوع ولكن للوفا et Banks وبتلوته، مضلعة ثلاثية، سطحها به عروق شبكية.

أطراف الحقول والأراضي غير المزروعة

موطن:

6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض Anchusa strigosa Banks et Sot. strigosa

36:28:35 N

33:11:8 E

السويداء

مركز السويداء

اللجاة



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year