



# Erodium subtrilobum Jord.

الاسم العلمي: Erodium subtrilobum Jord.

الفصيلة: GERANIACEAE

الاسم المحلي: الرقمة شبه ثلاثية الفصوص

التوصيف:

نبات حولي، موبر بكثافة بشعر أبيض مخروطي الشكل، وأحياناً غدي، بطول 10-50 سم، الساق صاعدة أو مفترشة. الأوراق القاعدية بطول 1.5-10 سم، نصلها قلبي؛ بيضوي إلى مثلثي الأجزاء بعرق، ذات فصوص مسننة، والفصوص الموجودة في الأوراق العلوية أقل انقساماً، كلها رهادية إلى خضراء، هوبرة قليلاً إلى جرداء. الأذينات حوالي 5 ملم، غشائية، بيضوية، حوامل النورات أطول عادة من الأوراق المقابلة، تحمل خيمة مزهرة مؤلفة من 3-7 أزهار. القنابات 3-4 مم، بيضوية عريضة **ويصل إلى 15 ملم** أطول الأزهار أطول عادة من الكأس تصل إلى 15 ملم بالطول. السبلات 5-7 مم، مستطيلة، ذات بوذة بطول 1 ملم، خضراء اللون مع هوامش بيضاء، وأعصاب واضحة، خيوط النسدية جرداء، البتلل بيضوية مقلوبة، لها نفس طول السبلات، غير متساوية إلى حد ما، وردية إلى رصاصية؛ **الأنثى 8-10 ملم** الأنثى بيضوية مقلوبة، لها نفس طول السبلات، غير متساوية إلى حد ما، وردية إلى رصاصية؛ الأنثى 8-10 ملم

4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدية	Erodium alnifolium Guss.	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/  
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة تصنيفية وفيتوكيميائية لأنواع الفصيلة الفرنوقية المنتشرة في فلورا حلب. /ألين ندير بطش/  
حلب جامعة - العلوم كلية - هاجستير اطروحة/Year2023/