



Tordylium carmeli (Labail.) Al-Eisawi

الاسم العلمي: Tordylium carmeli (Labail.) Al-Eisawi**الفصيلة:** APIACEAE**الاسم المحلي:****التوصيف:**

نبات عشبي حولي، طوله 60 - 150 سم. ساقه قائمة، مضلعة عليها أخاديد، ثنائية التفرع من الأعلى، عليها تسننات دقيقة وتجهة للأعلى. الأوراق مجزأة ريشية إلى 2 - 3 أزواج من الوريقات اللاتئة، تحمل أوباراً مشوكة كثيفة. الوريقات السفلى بيضاوية متطاولة، عويقة التسنن إلى مفصصة، وريقات الأوراق الوسطى متطاولة شريطية، الأوراق العلوية بسيطة شريطية. الذببات عديدة، طرفية وجانبية، الأشعة 3 - 7، غير متساوية، تحمل أوباراً شوكية القنابات والقنبيبان

الزهرة: 4 - 5 سم، تحمل أوباراً مشوكة. أسنان الكأس غير متساوية رحية. البتلات بيضاء شعاعية، تحمل أوباراً مشوكة من الأسفل، الخرجية ثنائية التفصص. الثمار منضغطة جانباً قرصية، 6 - 8 مم، قرصية، تحمل أوباراً، ذات حافة جناحية عريضة الثهيرات وحيدة البذرة.

موطن:

6 5 4

أشهر الإزهار:**حياة:**

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:**لون الزهرة:****القيمة الاقتصادية:** نوع جديد - فلورة سورية

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011