



Centaurea ptosimopappa Hayek.

الاسم العلمي: Centaurea ptoisimopappa Hayek.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، قائم، غير متفرع، يصل طوله إلى 2 متر، ساقه ملساء، مضلعة. الأوراق السفلى معنقة، رمحية - متطاولة، الأوراق الساقية متطاولة - شريطية، لائنة، الحافة تامة طولها 4-5 سم، الأوراق السفلى ملعقية، يصل طولها 13 سم، تحمل أوباراً قطنية، مركزية بلون بنفسجي. الهامات طولها 3,5 سم. تشبه الجرة، محاطة بأوراق بيضاوية عريضة. القنابات الغلافية عدة طبقات، بيضاوية، قاسية، ذات قمة حادة، القنبيبات خيطية. طول الأزهار 18 مم إنبوية، صفراء، الأنبوب طويل. ~~الأنبوب~~ ^{البراعم} الأسفل وعريض من الأعلى. الأسدية تحمل أوباراً قصيرة لامعة من الأعلى. طول السبسل 4 مم ملساء، سوداء ذات خطوط بيضاء. ~~عند القليم~~ ^{عند القليم} باللون البني وتحت نوع من النوع (2006)

المواقع الشجرية في شمال غرب سورية

موطن:

7 6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	:: E	:: N



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- للاستخدامات الطبيّة لأهم النباتات التابعة للفصيلتين المركّبة والشفويّة بين التراث العلمي العربي والعلم الحديث./عبد العليم بلو/ Year2006/أطروحة دكتوراه - كلية العلوم - جامعة حلب