

Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الاسم العلمي: Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي ثنائي الحول أو معمر، جذوره هغزية، سويكة، طولها 50-100 سم، أهلس. الأوراق السفلى هجزة ريشية، يصل طولها 15 سم، الفصوص رحية ذات تفصص قليل أو تسنن غير منتظم. الأوراق الساقية لاطنة، قواعدها بها زائدتين طويلتين ولتحتين بالساق لأسفل بطول 1-2 سم، الأوراق العلوية رحية- مثلثية، هدية. الهامات عديدة، طرفية وجانبية، طولها 12 سم، متطولة تحتوي على 5 أزهار. القنابات الغلافية لينة، هلساء، عدة طبقات، حوافها غشائية الخارجية قصيرة. الأزهار بيضاوية، الداخلية طويلة، شريطية. الأزهار صفراء، طولها 9 مم السبسلاء بنفسجية داكنة اللون. الثمار بيضاوية، مغطاة بغطاء صلب، تحتوي على 7-9 خطوط على كل جانب، تخربق النوع من بلاد إيران حسب كيو النوع هو البديل أو المرادف للنوع *Viminea Scarioha* (L.) W. Schmidt في الأوراق بسوي طول الثمرة، الهامات وتساقطة. موطن: التراب الحصوية

98765

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد - فلورة سورية

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011