



Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الاسم العلمي: Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي ثنائي الحول أو معمر، جذوره هغزية، سميكة، طولها 50-100 سم، أهلس. الأوراق السفلى هجزة ريشية، يصل طولها 15 سم، الفصوص رهمية ذات تفصص قليل أو تسنن غير منتظم. الأوراق الساقية لاطنة، قواعدها بها زائدتين طويلتين ملتصقتين بالساق لأسفل بطول 1-2 سم، الأوراق العلوية رهمية- مثلثية، هدية. الهامات عديدة، طرفية وجانبية، طولها 12 سم، متطولة تحتوي على 5 أزهار. القنابات الغلافية لينة، هلساء، عدة طبقات، حوافها غشائية الخارجية قصيرة. الأزهار بيضاء، الداخلية طويلة، شريطية. الأزهار صفراء، طولها 9 مم السبسلاء بنفسجية داكنة. الأزهار بيضاء، رهمية إلى اهليلجية ضيقة، منخفضة، تحتوي على 7-9 خطوط على كل جانب، تخضع النوع إلى يراد في مونيرد ولكن حسب كيو النوع هو البديل أو المرادف للنوع *Viminea Scahola* (L.) W. Schmidt في الأزهار بيضاء، طويلة، تحتوي على الثمرة، الهامات متساقطة. موطن: التراب الحصوية

98765

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011