



Biscutella didyma L.

Biscutella didyma L.

الاسم العلمي:

BRASSICACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، 15-40 سم، له ساق رئيسية بسيطة أو متفرعة من الأعلى، يحمل أوباراً لاهسة. الأوراق غالباً قاعدية وردية الترتيب، بيضاوية ومقلوبة □ وتطاولة، تستدق ناحية القاعدة، مسننة، الأوراق الساقية أصغر قليلاً، رهمية □ شريطية، نصف محتضنة للساق، تامة. النورة رأسيهية، طرفية، عديدة القنابات. السبلات 1,5-2 مم، شبه قائمة. البتلات 3 مم، وتطاولة صفراء، الثمار خريذلة، ومنضغطة جانبياً بشدة، تحمل أوباراً صولجانية، ذات فصين قرصيين، كل منها 5-7 مم. البذور بيضاء، مستقيمة، البذور 1,5-2 مم، كروية □ بيضاوية ومنضغطة، بنية، ولساء.

موطن:

8 7 6 5 4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011