

Arthrocnemum  
machrostachyum (Moric.)  
Moris.

Arthrocnemum macrostachyum (Moric) Poirainen & G. Kadereit

الفصيلة CHENOPODIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات جنوبي، معمر، عصاري، ينمو في الأراضي الهلحية، أهدس، كثيف التفرع، يصل ارتفاعه إلى 1 متر. ساقه متفصلة، لونه أخضر يتحول إلى أخضر مصفر إلى حمر. الأوراق درشفية تتكون عند المفصل، متقابلة، متصلة. الأزهار صغيرة جدا، توجد في أعلى الفروع في مجموعات ثلاثية عند المفصل، مكونة تركيباً يشبه السنبل. الأسدية 1-2، الهياسم 2. الثمار فقيرة مثنائية، غشائية. البذور بيضاوية عديسية، سوداء، لامعة، سطحها خشن دقيق.

المميزات:

يُرد إسم النوع في كيو Arthrocnemum macrostachyum (Moric) Koch.K

الترب الرملية الشاطئية

موطن:

9 8 7 6 5

أشهر الأزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد - فلورة سورية

Arthrocnemum macrostachyum (Moric) Poirainen & G. Kadereit	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/  
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/  
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year