

Clinopodium vulgare L.

Clinopodium vulgare L.

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، يحمل أوباراً كثيفة، قائم، 20-70 سم. الأوراق بيضاوية إلى بيضاوية ممتطولة، حوافها مسننة. السواريات كثيفة، تقريباً كروية، عديدة الأزهار. القنابات شبيهة بالأوراق، القنبيبات شريطية، تساوي طول الكأس، تحمل أوباراً طويلة. الكأس 9 × 12 مم، 13 عرقاً، ثنائي الشفة، يحمل أوباراً كثيفة، الأنبوب منحنى، الأسنان العلوية 2,5 × 4 مم، السفلى 4,5 × 5 مم، تحمل أوباراً طويلة. التويج بنفسجي، 1-2 سم، الأنبوب بارز، الشفة العلوية غائرة، السفلى 3 فصوص. الهياكل المورفولوجية. الثمرات شبه كروية، ملساء

موطن:

98765

أشهر الإزهار:

حياة:

اوروبي سيبيري

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011