



Stachys diversifolia Boiss.

Stachys diversifolia Boiss.

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات معمر، له ريزومات أرضية كثيفة ومتخشب، تحمل أوباراً عند العقد، وهبطاً بأوراق حشفية، تعطي فوراً تحمل أوراقاً وأخرى تحمل أزهاراً، الفروع الورقية تعطي أوراقاً متبادلة وعنقة، بيبضاوية، طويلة الأعناق، طول الأعناق 1-6 سم، تحمل أوباراً، النصل 2-3,5 سم السطح العلوي أهلس أو يحمل أوباراً خفيفة جداً، توجد أوبار على السطح السفلي وخاصة عند العروق. الفروع الهوائية قائمة، يصل طولها 80 سم، مضلعة، تحمل أوباراً، تحمل أوراقاً متقابلة، لاطنة، رحية- شريطية، طولها 10-12 سم، حوافها تامة، النوبار مثل الأوراق السفلى. الأزهار تتجمع في مجموعات محدودة في أبط الأوراق العلوية، القنابات بيبضاوية عريضة أقصر من طول الكأس 2-3 مم، ذات قهر مشوكة مدببة، بعضها شريطية ضيقة. الكأس 5 مم يحمل أوباراً غدية ولاهسة وخاصة عند الحافة، به 10-12 حبة، الإنبوب متساوية أقصر من الإنبوب، مدببة، تقريباً مشوكة، قواعد عريضة توجد عندها أوبار طويلة. التويج 11-12 مم، زهري اللون، يحمل أوباراً من الخارج، الشفة العلوية مستقيمة، أو قائمة للأعلى غير مفصصة، الشفة السفلى 3-6 مم، الفص الأوسط أكبر وذو تفصص ضحل، مزركش باللون الزهري والأبيض، الإنبوب بارز من الكأس. الأسدية بارزة من الإنبوب، الأسدية الظهرية أقصر من البطنية، الخيوط تحمل أوباراً كثيفة، الهابر بنفسجية غامقة، مرتبطة بالخيوط من الانتواء الجفلي في القلم مقسم إلى متوسطين شبه متساويين. الثمار بيبضاوية، 2-2,5 مم، عريضة من الأعلى وضيقة من الأسفل، بنية داكنة، ذات بقع فاتحة، سطحها خشن دقيق. لون الأزهار.

متوطن Endemic

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدية	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011