



Juniperus oxycedrus L.

Juniperus oxycedrus L. **الاسم العلمي:**

CUPRESSACEAE **الفصيلة:**

عديش العرعر الشربيني **الاسم المحلي:**

التوصيف:

شجرة أو شجيرة يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار وحيدة الجنس، ثنائية المسكن. الأوراق منبسطة مدببة مخززية القوة، خضراء باهتة، على سطحها العلوي خطلن أبيضان الأغصان الفتية ثلاثية النضلاع بشكل غير واضح. الأوراق مرتبة في حلقات ثلاثية أبرية الشكل عريضة قليلا في قاعدتها وهشوكية. تظهر المخاريط المؤنثة والأزهار المذكرة في بداية الربيع المخاريط الذكرية منفردة شبه لاطنة شبه كروية. المخروط الثمري الناضج كروي أحمر اللون. البذور تنضج في السنة التالية **المخاريط** وهي كروية ذات لون أخضر مدمر إلى أحمر قرميدي، تحوي داخلها 2-4 بذور.

ينمو على التربة الكلسية. ينتشر في حوض المتوسط ويهدد إلى المناطق المجاورة. متحمل وبشكل كبير للجفاف ولكنه نسبياً محب للحرارة، ومحب للضوء. يتكاثر بالبذور واعاشيا. يتميز تصنيفيا بالأوراق الإبرية والمخروط الناضج أحمر بني، تحول سقاً خفيفاً مبيضة قطره 8-10 مم ينتشر الشربين طبيعياً في طوايق بيومناخية بدءاً من النصف الجاف مروراً بشبه الرطبة حتى الرطبة بالمتغيرات الحرارية من الباردة حتى الحارة وعلى أنواع مختلفة من الصخور الأرم الكلسية والمارنية والإندفاعية البازلتية والصخور الخضراء، وهو من عناصر الطابق النباتي المتوسطي الحقيقي.

الانتهاج الجغرافي: متوسطي

لون الزهرة:

نباتات غابوية **القيمة الاقتصادية:** plant Forest

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدية	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	35:49:57 E	36:2:10 N





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •