

Sideritis syriaca (Boiss et Reut.) Boiss.

الاسم العلمي: *Sideritis syriaca* (Boiss et Reut.) Bouché

الفصيلة: LAMIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات جنوبي، طوله 60-100 سم. ساقه عديدة، قائمة، مضلعة، تحمل أوباراً كثيفة. الأوراق بسيطة، ومتطاولة-محمية، ذات قعر حادة، تحمل أوباراً كثيفة، السطح السفلي يحمل أوباراً زيتية. السوريات متباعدة، بها 6 أزهار. القنابات 2، بيضاوية، عريضة، أطول من الأزهار ذات عروق شبكية، قهرها مدببة ومشوكة، القنبيبات معدومة. الكاس 9 مم، عروقه ليست واضحة يحمل أوباراً كثيفة وقطرات زيتية، الأسنان متساوية، طولها 3 مم. التويج طوله 1 سم، يحمل أوباراً من الخارج، الأنبوب طويل، الشفة العلوية متجهة للأعلى، ذات فصين مدببين غير عهيقين، بها خطين بنفسجين طوابع متوازنين، الشفة السفلى تقريباً أممية، الفص الأوسط عريض، الفصوص تحمل أوباراً من الداخل. النسدية مغمورة داخل أنبوب التويج. الهياسر 2 ورقية، محيطه بالقلم، غير متساوية. الثمار 4 بنيووطن:

76

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد - فلورة سورية

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/https://powo.science.kew.org/taxon/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011