



Styrax officinalis L

Styrax officinalis L

الاسم العلمي:

STYRACACEAE الفصيلة:

الاسم المحلي: عبهر

التوصيف:

شجرة صغيرة، طولها 2-6 متر، تحمل أوباراً نجيلية. الفروع الحديثة رهادية. الأوراق بسيطة، معنقة، متبادلة، بياضوية، حوافها ناعمة، السطح السفلي رهادي والعلوي أخضر. النورات راسيحية قصيرة، بها 3-6 أزهار. الكأس جرسى، طولها 6-7 مم، غير مفصص. التويج طولها 2 سم، أبيض، به 5-8 فصوص متطاولة. الأسدية 8-18، حرة، الخيوط بتلية، الهابز متطاولة، صفراء فاتحة. المبيض علوي، وحيد الكريهة. الثمار حسلية، كروية، قطرها 1-1,5 سم، تحمل أوباراً دقيقة، خضراء فاتحة، تتفتح بواحدة في مصاريع، بها منقار طويل مهدب الكأس مستدير في قاعدة الثمرة. ينمو في الهاكي والغابات. يتحول الصقيع حتى -10°. يعطي رائحة له أهمية طبية كبيرة. هذه الشجرة أو الشجيرة النفضية تابعة لشرق المتوسط بصورة رئيسية ومع أنه يمتد غرباً حتى فرنسا، فإن أزدهاره لا يظهر إلا في المنطقة الشرق الأوربية التي يشبه رهادية على مساحات واسعة من هاكي المتوسط. يشكل الحوز في مرتفعات الجولان توجهات شبه صافية على ارتفاع يتراوح بين 1000 - 1500 م فوق سطح البحر.

54

أشهر الأزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية غابوي plant Forest

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
	:: N	:: E	منطقة اللاذقية	محمية الفرلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011