Erodium ciconium (L.) L’Her.

الاسم العلمي: Erodium ciconium (L.) L'Her.

الفصيلة: GERANIACEAE

الاسم المحلي: القرنوة اللقلقية (البختري ، الرقم)

التوصيف:

نبات حولي، موبر بأوبار مستقيمة منتصبة بطول 2-4 ملم، كثيف الشعر خاصة الساق. الجذر وتدي يصل إلى 12 سم، تخرج منه جذور عرضية رفيعة. النبات غدي ولزج، ذو رائحة محببة خفيفة، ارتفاعه 10-70 سم. الساق صاعدة أو منتصبة، موبرة بقوة، يتفرع منذ العنق لعدة فروع ثخينة، تتفرع بدورها من منتصفها، يوجد في منطقة التشعب 4 أذينات مثلية حادة القمة، بطول 6-8 ملم، ذات بوزة طويلة بطول 3-4 ملم، وذات لون مسمر بني، الشمراخ مجنح ومسنن قليلاً في المسافات بين العقدية. الأوراق القاعدية ذات محيط بيضوي، يصل طولها إلى 15 سم، ريشية مجزأة أو ثنائية الريش ومجزأة إلى قطع هي بدورها مجزأة أو sect، تكون الوريقات متفاوتة الأطوال، دون أن يبقى العرق الوسطي للورقة عار، حيث يكون الزوج الأول أقصر من الثاني الذي يشكل الجزء الأعرض من الورقة، يليه زوجان أقصر وتكون الوريقة الطرفية والثنوية بلا أجزاء، وكل جزء بدوره مقسوم جزئياً لعدد من الفصوص. تكون الأوراق القمية أكثر تشعباً وتجعداً. حوامل النورات موبرة بأوبار قصيرة مقارنة مع أوبار الساق، وهي أكثر انتظاماً منها، وذات أطوال متساوية، وهي تخرج من إبط الأوراق العلوية طولها 1-4 سم. تتكون النورة من 8-10 أزهار، بعضها لاطئة، وبعضها محمولة على سويقات 5-10 ملم، القلافة (قنابة في قاعدة النورة) تتكون من 8 قطع صغيرة مثلثية حادة طولها 5 ملم، ذات بوزة طولها 1 ملم. السبلات غشائية بيضية بطول 8 ملم، ذات بوزة بطول 5-6 ملم وعليها 5 خطوط خضراء. البتلات بطول السبلات دون البوزة أو تتجاوزها حتى الضعف، بنفسجية بيضوية مقلوبة، الثمار بطول 5-11 ملم، والسبلات متنامية بعد الإثمار وتصل لطول 1 ونصف سم، الكرابل ذات تضيرات غير محاطة بثلم

عدد الصبغيات: 2n = 32

أشهر الإزهار: 3 4 5

لون الزهرة: SOON

الانتشار الجغرافي:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
البلاطة	السويداء	السويداء	:: E	:: N

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة تصنيفية وفيتوكيميائية لأنواع الفصيلة الغرنوقية المنتشرة في فلورا حلب. /ألين نديم بطش/ حلب جامعة - العلوم كلية - ماجستير اطروحة/Year2023